


TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT PAR PCR NASOPHARYNGÉ



1. Écrire le nom du patient sur le tube.
2. Remplir le bon pour le laboratoire en cochant le type de prélèvement et le type d'analyse.
3. Faire le **Frottis nasopharyngé** : (avec un écouvillon souple)
 - Introduire l'écouvillon dans le conduit nasal jusqu'à atteindre le nasopharynx (environ 7 cm de l'arcade chez l'adulte)
 - Faire 2 rotations
4. Introduire directement l'écouvillon dans le tube, le casser à ras bord.
5. Refermer le tube.
6. Désinfecter le tube avec une lingette imbibée d'alcool à 70°.
7. Glisser le tube dans une pochette plastique kangourou :
 - Mettre le prélèvement dans la partie fermée
 - Mettre le bon dans l'autre partie

[Voir la vidéo de démonstration de la technique par NEIM](https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE)
(<https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE>)

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [Technique de prélèvement naso-pharyngé](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Technique_de_pr%C3%A9l%C3%A8vement_naso-pharynge_0.pdf)
(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Technique_de_pr%C3%A9l%C3%A8vement_naso-pharynge_0.pdf)

Dernière mise à jour le 29/01/2021