

Fonctions concernées : Médecins et personnel infirmier des services de soins

Fiche Technique

PATHOGÈNES À RECHERCHER

SITES À PRÉLEVER (FROTTIS)

MRSA : <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline	Nez + gorge+ plis inguinaux (3 frottis pouvant être poolés)
VRE : Entérocoque résistant à la vancomycine (<i>E. faecium</i> , <i>E. faecalis</i>)	Ano-rectal (1 frottis, s'assurer de la présence matière fécale)
ESBL : Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi, CRE=EPC : Entérobactéries productrices de carbapénémase	Ano-rectal (1 frottis, s'assurer de la présence matière fécale)
Autres BMR avec carbapénémase ou autre résistance (à rechercher sur avis HPCI)	Ano-rectal et sites cliniques (site d'insertion de cathéter, plaies, culture sécrétions endo-trachéales si intubation, culture d'urines si sonde vésicale)

MESURES À INSTAURER :

MAC = Mesures Additionnelles contact; **MAG** = Mesures Additionnelles gouttelettes si infection respiratoire ; **PS** = Précautions Standard

Indications au dépistage	Urgences : mesures lors prise en charge	Soins Intensifs : mesures à l'admission	Unités de soins : mesures à l'admission
MRSA – ESBL - CRE			
transféré d'un établissement de soins à l'étranger (hors Suisse)	MAC+/_MAG	MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle	MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle
hospitalisé > 24h à l'étranger dans les 12 mois qui précèdent			
hémodialyse dans un centre étranger dans les 12 mois précédant			
en provenance d'un programme humanitaire de l'étranger			
connu comme porteur de BMR (frottis selon indication HPCI)			
VRE			
transféré d'un établissement de soins à l'étranger ou ayant séjourné dans un établissement du canton de Berne dans les 12 derniers mois	MAC+/_MAG	MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle	MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle
hospitalisé > 24h à l'étranger dans les 12 mois qui précèdent			
hémodialyse dans un centre étranger dans les 12 mois précédant			
en provenance d'un programme humanitaire de l'étranger			
connu comme porteur de BMR (frottis selon indication HPCI)			

Lors d'admission directe en centre de traitement et réadaptation (CTR) d'un patient à risque, le dépistage et la prise en charge avec le service hpci ou l'unitéhpci

RÉSULTATS DU DÉPISTAGE

Positifs pour MRSA, ESBL non- <i>E.coli</i> , CRE, VRE, autre BMR	Négatifs
Poursuivre les mesures instaurées à l'admission et aviser inf. HPCI	Précautions Standard ; pour VRE s'adresser au service HPCI

