

Amibiase intestinale, dysenterie amibienne



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Entamoeba histolytica</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: par l'eau ou par les denrées alimentaires • à l'hôpital: éventuellement par l'intermédiaire des mains du personnel de cuisine qui manipulerait les denrées alimentaires en ne respectant pas les règles d'hygiène (rare) • transmission possible par endoscope mal nettoyé/désinfecté
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	De 2 à 4 semaines. Dans les cas extrêmes: quelque jours ou plusieurs mois
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que des amibes sont excrétées dans les selles

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Contact/communication	Toute diarrhée chez le personnel de cuisine colonisé/infecté doit être évaluée par la médecine du travail
-----------------------	---