

## Angine à streptocoque du groupe A



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par des particules de grosse dimension (&gt; 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source</li> <li>• les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes &gt; mains &gt; yeux ou bouche)</li> <li>• portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Chez l'adulte : Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Chez les nourrissons et les jeunes enfants: GOUTTELETTES
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement antibiotique adéquat

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Chez l'enfant, port d'un masque de soins par le personnel lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres de l'enfant

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles