

Bactéries productrices de carbapénèmases

EPC (entérobactéries productrices de carbapénèmases) ou CRE (carbapenem-resistant-enterobacteriaceae), Pseudomonas et Acinetobacter producteurs de carbapénèmases



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> producteurs de carbapénèmases
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénémase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	<p>Contrôle de la colonisation (portage) en cours de séjour ou lors d'admission d'un patient connu porteur de EPC (CRE) > 6 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • frottis rectal (avec matière fécale visible), culture d'urine si sonde et autre site colonisé • si résultat du 1er frottis négatif, faire un 2ème frottis à J 7 • si résultat du 2ème frottis négatif, faire un 3ème prélèvement par une culture de selle à J 14
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Transport du patient	En cas d'hospitalisation, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Mesures spécifiques	Distribuer au patient le dépliant d'information (Patient porteur de CRE)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques. Lors des soins à domicile chez un patient présentant des diarrhées:
----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> port d'une blouse de protection pour les soins avec un contact direct avec le patient
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel</p> <p>Après la consultation:</p> <ul style="list-style-type: none"> désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de consultation, charriot de soins, stéthoscope, brassard à pression, etc.) <p>A domicile, en présence de diarrhées:</p> <ul style="list-style-type: none"> désinfection quotidienne des sanitaires avec de l'eau de javel 2% (du commerce)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration par le médecin dans un délai d'une semaine
---------------------------------	--