

## Conjonctivite virale aiguë ou hémorragique



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	Entérovirus, Adénovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées</li> <li>Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Entérovirus: 12h à 3 jours Adénovirus: 5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité	Entérovirus: au moins 4 jours après le début des symptômes cliniques Adénovirus: au maximum 14 jours après le début des symptômes cliniques

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Hygiène des mains	Avec une solution hydro-alcoolique efficace pour adénovirus, ceci entre chaque soin
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée de la maladie Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique
Transport du patient	Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques (y compris sécrétions lacrymales)
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel Après la consultation désinfection minutieuse du matériel à usage multiple <ul style="list-style-type: none"> <li>stéthoscope, otoscope, lampe à fente, etc.</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles