

Contact VRE (Entérocoque résistant à la vancomycine)

Contact ERG (entérocoque résistant aux glycopeptides)



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Enterococcus faecium</i> ou <i>faecalis</i> résistant à la vancomycine (VRE ou ERG)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage (très variable: de quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	Consultation d'un patient ayant eu un contact avec un patient porteur de VRE, en accord avec l'unité cantonale HPCI: <ul style="list-style-type: none"> • <u>contrôle de la colonisation (portage) par un frottis rectal (avec matière fécale visible) à J0, J7 et j14</u>
Transport du patient	En cas d'hospitalisation, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles