

Contact carbapénèmase

Contact EPC (entérobactérie productrice de carbapénèmase), contact CRE (carbapenem-resistant-enterobacteria)



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> producteurs de carbapénèmases
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénèmase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	<p>Consultation d'un patient ayant eu un contact avec un patient porteur de CRE (EPC), en accord avec l'unité cantonale HPCI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>contrôle de la colonisation (portage)</u> par 3 frottis rectaux (avec <u>matière fécale visible</u>) à au minimum J0, J7 et J14 après contact

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non