

Diphthérie cutanée



Contact

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'exams, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	2 à 5 jours
Durée d'infectiosité	Le plus souvent 2 à 4 semaines, si non traitée

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Transport du patient	Pansement étanche et propre Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	Rappel vaccinal pour les personnes exposées, si indiqué: contacter la médecine du personnel

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel Après la consultation <ul style="list-style-type: none"> • désinfection minutieuse de l'environnement immédiat du patient (table d'examen, charriot de soins, stéthoscope, brassard à pression, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration par le médecin dans les 24 heures des souches produisant des toxines
Mesures en cas d'épidémie	<p>Le statut vaccinal des personnes exposées (contact étroit) doit être vérifié et mis à jour le cas échéant. Ces personnes doivent être informées et surveillées (frottis de gorge pour détecter les porteurs asymptomatiques) et bénéficier d'une antibioprophylaxie si frottis de gorge positif</p> <ul style="list-style-type: none"> • adultes: azithromycine 500 mg/j pendant 3 jours ou amoxicilline 1 gr 3x/j pendant 14 jours • enfants: amoxicilline 100 mg/kg/j en 3 prises pendant 14 jours