

## Epiglottite confirmée



Gouttelettes

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Haemophilus influenzae type b</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmission par des particules de grosse dimension (&gt; 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc.</li> <li>• ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source</li> <li>• les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur</li> <li>• portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Probablement 2 à 4 jours
Durée d'infectiosité	24 heures après le début d'une antibiothérapie efficace

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	GOUTTELETES pour les cas confirmés par un médecin ORL
Placement du patient	<p>Mise à l'écart du patient dans l'attente de la consultation Si passage en salle d'attente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• faire porter un masque au patient</li> </ul> <p>Ces mesures peuvent être levées <u>24 heures après le début d'un traitement antibiotique adéquat</u></p>
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement adéquat
Transport du patient	Port d'un masque de soins par le patient Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2

	mètres du patient ceci durant les 24 premières heures du traitement antibiotique adéquat Pas nécessaire si simple passage dans la salle de consultation
--	--

**Nettoyage/désinfection**

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

**Déclaration du cas**

Documentation système d'alerte	Déclaration du médecin dans les 24h après confirmation du laboratoire
--------------------------------	---