

Erythème infectieux

5ème maladie



Gouttelettes

Epidémiologie

Agent infectieux	Parvovirus B19
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • transmission par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc. • ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source • les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur • portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	4 à 14 jours, max. 20 jours
Durée d'infectiosité	<ul style="list-style-type: none"> • jusqu'à 7 jours après le début de la maladie (en principe il n'y a plus de transmission après l'apparition de l'exanthème) • patient avec crise aplasique, jusqu'à 1 semaine après la fin des symptômes • Infection chronique (plusieurs mois) chez certains patients immunocompromis

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	GOUTTELETTES
Placement du patient	<p>Mise à l'écart dans l'attente de la consultation Si passage en salle d'attente</p> <ul style="list-style-type: none"> • faire porter un masque au patient
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 7 jours après le début de la maladie (en principe il n'y a plus de transmission après l'apparition de l'exanthème)
Transport du patient	Port d'un masque de soins par le patient Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient Pas nécessaire si simple passage dans la chambre ou en salle de consultation
Mesures complémentaires	Les femmes enceintes devraient s'abstenir d'avoir des contacts avec les malades, étant donné le risque d'infection materno-foetale

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles