

Fièvre jaune

Epidémiologie

Agent infectieux	Arbovirus (Flavivirus)
Réservoir	Zones urbaines: homme, moustiques (<i>Aedes aegyptii</i> , <i>Aedes spp</i>) Forêts: primates, marsupiaux, moustiques (<i>Aedes aegyptii</i> , <i>Aedes spp</i>)
Mode de transmission	Par les moustiques du genre <i>Aedes</i>
Transmission interhumaine	Non si absence du moustique vecteur
Période d'incubation	3 à 6 jours
Durée d'infectiosité	<ul style="list-style-type: none"> • les personnes malades sont infectieuses pour les moustiques pendant les 3 à 5 jours premiers jours • les moustiques (vecteurs) deviennent infectieux 9 à 12 jours après le repas de sang et le restent en permanence

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans les 24 heures
---------------------------------	---