

Gastroentérite à *Campylobacter*



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Campylobacter sp.</i> , <i>Campylobacter coli</i>
Réservoir	Animaux (volaille, chiens, chats, bovins). L'homme joue un rôle secondaire en tant que réservoir
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> matériel infectieux: selles, liquide gastrique dans la communauté: par ingestion d'aliments contaminés (volaille, foie de volaille, lait frais, viande insuffisamment cuite) à l'hôpital: par contact direct avec les selles ou par l'intermédiaire de matériel contaminé (endoscopes)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 10 jours, le plus souvent 2 à 5 jours
Durée d'infectiosité	Pendant toute la durée de la maladie (quelques jours à plusieurs semaines)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Le personnel atteint d'entérite à <i>Campylobacter sp</i> et travaillant dans les cuisines doit être mis à l'arrêt de travail pendant la phase aiguë de la maladie

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Non Les flambées de cas doivent être déclarées par le médecin dans un délai d'un jour
---------------------------------	--