

Gastroentérite à Yersinia



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Yersinia enterocolitica</i> et <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>
Réservoir	Animal (<i>Y. enterocolitica</i> : principalement le porc. <i>Y. pseudotuberculosis</i> : oiseaux et mammifères sauvages)
Mode de transmission	Transmission féco-orale par ingestion d'aliments contaminés (porc mal cuit) ou d'eau contaminée, ou par contact direct avec des personnes ou des animaux infectés. <i>Y. enterocolitica</i> peut se multiplier dans le réfrigérateur
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	3 à 7 jours (<10 jours)
Durée d'infectiosité	Excrétion fécale pendant toute la durée des symptômes, habituellement 2 à 3 semaines, exceptionnellement 2 à 3 mois en l'absence de traitement

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non