

Gastroentérite à norovirus

Gastroentérite à sapovirus



Contact



Gouttelettes

Epidémiologie

Agent infectieux	Norovirus (ou Norwalk-like virus) Sapovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: par contact direct ou indirect avec du matériel ou l'environnement contaminé, dans des rares cas par le biais d'aliments, d'eau ou de boisson contaminés • à l'hôpital: par contact direct ou indirect avec du matériel ou l'environnement contaminé, ou via dissémination de gouttelettes lors de vomissements
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	24 à 48 heures (extrêmes: 10 à 50 heures)
Durée d'infectiosité	L'agent infectieux est présent en grandes quantités dans les selles et les vomissures pendant la phase aiguë de la maladie puis encore au moins 2 jours après. La durée d'infectiosité est prolongée chez les jeunes enfants et les patients immunosupprimés

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT (GOUTTELETTES en cas de vomissements)
Placement du patient	Mise à l'écart dans l'attente de la consultation Eviter la salle d'attente
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 48h après la fin des symptômes
Mesures spécifiques	Insister auprès du patient sur l'importance du lavage des mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques A domicile et en consultation, port d'une blouse lors des soins rapprochés (contact corporel avec le patient)
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient, ceci durant la phase de vomissement Pas nécessaire si simple passage dans la chambre ou dans la salle de consultation
Mesures complémentaires	Eviction immédiate de tout personnel présentant des symptômes de gastro-entérite jusqu'à 48h après la fin des symptômes

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	A domicile <ul style="list-style-type: none"> • traitement du linge et des vêtements à $\geq 60^{\circ}\text{C}$ • ajouter un produit désinfectant (oxygène actif ou autre désinfectant pour le textile) lors du lavage à $<60^{\circ}\text{C}$
Environnement	A domicile <ul style="list-style-type: none"> • désinfection quotidienne des sanitaires avec une solution d'eau de Javel (hypochlorite de Na) à une concentration de 0.5% ou produit efficace contre le norovirus
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles