

Gastroentérite à rotavirus



Contact

Epidémiologie

Agent infectieux	Rotavirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Par contact direct avec les selles, l'environnement ou du matériel contaminé par des selles
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	24 à 72 heures
Durée d'infectiosité	4 à 6 jours (plusieurs semaines pour les patients immunosupprimés)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique, en principe 4-7 jours

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, lors de soins avec un contact direct peau à peau chez un patient avec diarrhées ou si risque de projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques Pas nécessaire pour un simple passage en chambre ou lors de la consultation
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	Le personnel atteint de gastroentérite à rotavirus doit être mis en arrêt de travail jusqu'à disparition des symptômes

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Documentation système d'alerte	Non Les flambées de cas doivent être déclarées par le médecin dans un délai de 1 jour
--------------------------------	--