

## Herpès simplex néonatal

### Primaire, sévère



#### Epidémiologie

Agent infectieux	Virus herpes simplex de type 1 ou 2
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lors d'accouchement par voie basse</li> <li>• plus rarement in utero ou post partum</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	2 à 12 jours
Durée d'infectiosité	jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection

#### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Transport du patient	Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

#### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, lors de soins avec contact peau à peau ou si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques Pas nécessaire pour un simple passage en chambre ou lors de la consultation
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

#### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles