

## Infection ou colonisation à entérobactéries non-*E. coli* productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (ESBL)

### Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries autres que <i>E. coli</i> ( <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>E. cloacae</i> ...) productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (ESBL ou BLSE)
Réservoir	Homme, animaux
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct entre patients</li> <li>• par l'intermédiaire du personnel (mains)</li> <li>• par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, dépend de la bactérie incriminée
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée (portage intestinal de quelques mois à plusieurs années)

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Non, l'application des Précautions Standard est suffisante
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée du portage Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage d'entérobactéries non <i>E.coli</i> productrices d'ESBL ( selon indication du service HPCI)
Transport du patient	Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	A domicile, en présence de diarrhées <ul style="list-style-type: none"> <li>• port d'une blouse de protection par le personnel lors de soins avec un contact direct avec le patient ou son environnement immédiat</li> </ul>

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel Après la consultation <ul style="list-style-type: none"> <li>• désinfection minutieuse de l'environnement immédiat du patient et du matériel à usage multiple (table de consultation, chariot de soins,</li> </ul>

	<p>brassard à pression, stéthoscope, etc)</p> <p>A domicile en présence de diarrhées</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• désinfection quotidienne des sanitaires avec de l'eau de javel 2% (du commerce)</li></ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles