

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A

Infections cutanées, fasciite nécrosante, syndrome de choc toxique (TSS-like), endométrite (fièvre puerpérale), pharyngite, pneumonie



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire • transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie • la dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source • les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur • portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) • transmission materno-foetale
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	<ul style="list-style-type: none"> • 24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat • 10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Si pharyngite, angine, scarlatine: Mesures Additionnelles Gouttelettes
Placement du patient	Mise à l'écart en attente de la consultation Si passage en salle d'attente: <ul style="list-style-type: none"> • faire porter un masque au patient

Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat
Transport du patient	Port d'un masque de soins par le patient Avertir le service/établissement de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Mesures spécifiques	Ces mesures s'appliquent uniquement lors de maladies invasive à <i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A. En présence d'infection localisée (plaie, endométrite, etc), l'application des Précautions Standard est suffisante.

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un périmètre de 1-2 mètre du patient. Pas nécessaire si simple passage en salle de consultation

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel.
Déchets	Élimination des déchets selon les filières habituelles