

Infections respiratoires virales chez l'adulte



Gouttelettes

Epidémiologie

Agent infectieux	Adénovirus, Coronavirus (non SARS, non MERS), Human Metapneumovirus, Parainfluenza, Rhinovirus, Virus respiratoire syncytial (RSV), Influenza (grippe saisonnière), COVID-19 (SARS-CoV-2), Nouveau coronavirus COVID-19
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Principalement par gouttelettes ou contact direct Transmission par aérosol possible dans des situations spéciales : <ul style="list-style-type: none"> • Soins rapprochés à la sphère ORL du patient (rayon de < 1m) notamment si soin prolongé/répétitif (> 15 min cumulés) ou • Geste générant des aérosols
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	12 heures à 5 jours (selon l'agent)
Durée d'infectiosité	En général de 1 jour avant à 5 jours après le début des symptômes. Infectiosité prolongée chez les patients immunosupprimés

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	GOUTTELETTES
Placement du patient	Mise à l'écart dans l'attente de la consultation Si passage en salle d'attente <ul style="list-style-type: none"> • faire porter un masque au patient (si possible)
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Durée des mesures Au minimum 5 jours depuis le début des symptômes ou le premier test positif (si pas de symptômes) <ul style="list-style-type: none"> • Et absence de fièvre depuis minimum 24h • Et amélioration clinique des autres symptômes
Transport du patient	Port d'un masque de soins par le patient si transfert en milieu de soins Avertir le service de destination

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins type II/IIR Masque FFP2 si : <ul style="list-style-type: none"> • Soins rapprochés à la sphère ORL du patient (rayon de < 1m)

	<p>notamment si soin prolongé/répétitif (> 15 min cumulés) ou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geste générant des aérosols
Mesures complémentaires	

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Documents associés

Documents en lien	Voir la recommandation des virus respiratoires
-------------------	--

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui dans tous les cas
Déclaration au médecin cantonal	<p>Déclaration au médecin cantonal Selon recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virus respiratoires - CMS-OSAD-Indépendant (partie déclaration) • OFSP : Déclaration des maladies infectieuses