

Kérato-conjonctivite épidémique



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	Adénovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 14 jours après le début des symptômes

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Transfert/sortie	Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel Après la consultation <ul style="list-style-type: none"> désinfection minutieuse de tout le matériel à usage multiple utilisé (lampe à fente, otoscope, stéthoscope, brassard à pression, etc.)
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel Après la consultation <ul style="list-style-type: none"> désinfection minutieuse de tout l'environnement proche du patient (table/fauteuil de consultation, chariot de soins, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Documentation système d'alerte	Non Les flambées de cas doivent être déclarées par le médecin dans un délai de 1
--------------------------------	---

	jour
--	------