

Pédiculoses

Poux de tête et poux de corps



Précautions
Standard

Epidémiologie

| | |
|---------------------------|--|
| Agent infectieux | <i>Pediculus capitis</i> ou <i>Pediculus corporis</i> |
| Réservoir | Homme Les poux du corps peuvent être vecteurs et transmettre 3 agents infectieux: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rickettsia prowazeki</i> • <i>Bartonella quintana</i> • <i>Borrelia recurrentis</i> |
| Mode de transmission | <ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat, linge, literie) |
| Transmission interhumaine | Oui |
| Période d'incubation | <ul style="list-style-type: none"> • libération des larves après 7 à 10 jours (température idéale 29°C-32°C) • durée du stade larvaire de 9 à 12 jours en fonction de la température |
| Durée d'infectiosité | Tant qu'il reste des oeufs vivants sur les cheveux, les poils ou les vêtements |

Prise en charge du patient

| | |
|------------------------|--|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante |
| Matériel de soins | Privilégier du matériel à usage unique |
| Voisins | Investigation des personnes vivant sous le même toit ou en contact étroit |
| Durée des mesures | Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement efficace Pour le traitement se référer à la recommandation Pédiculoses - Mesures en milieu de soins |
| Mesures spécifiques | Investigation des personnes vivant sous le même toit ou en contact étroit Les vêtements et effets personnels du patient doivent subir un traitement approprié contre les poux <u>Pédiculose du cuir chevelu</u> <ul style="list-style-type: none"> • lavage à 60° des bonnets, foulards, taies d'oreiller, linge de lit, vêtements, peluches et doudous • mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement • désinfection des peignes et brosses à cheveux avec un shampoing pédiculicide • si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un |

| | |
|--|---|
| | <p>pédiculicide en poudre ou spray</p> <p><u>Pédiculose du corps et pubienne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • lavage à 60° des vêtements, sous-vêtements, linge de lit • mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement • si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un pédiculicide en poudre ou spray |
|--|---|

Mesures de protection/prévention pour le personnel

| | |
|-------------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Masque | Non |
| Mesures complémentaires | Eviter les contacts cheveux à cheveux (soignant: cheveux attachés) |

Nettoyage/désinfection

| | |
|-------------------|--|
| Matériel de soins | Utiliser le détergent/désinfectant usuel |
| Déchets | Elimination des déchets selon les filières habituelles |

Déclaration du cas

| | |
|---------------------------------|--|
| Déclaration au service HPCI | Oui, si la personne vit en institution |
| Déclaration au médecin cantonal | Non Si le patient est un enfant scolarisé ou une personne vivant en institution, le service médical scolaire ou de l'institution doit être averti |