

Rubéole



Gouttelettes

Epidémiologie

Agent infectieux	Virus de la rubéole (famille des Togavirus)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie • la dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source • les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur • portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	14 à 17 jours, avec des extrêmes allant de 14 à 21 jours
Durée d'infectiosité	Une semaine avant et jusqu'à 7 jours après le début de l'exanthème. Les enfants qui ont contracté le virus in-utero peuvent excréter le virus pendant des mois après la naissance

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	GOUTTELETES
Placement du patient	<p>Mise à l'écart dans l'attente de la consultation Si passage en salle d'attente</p> <ul style="list-style-type: none"> • faire mettre un masque au patient
Matériel de soins	<p>Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique</p>
Durée des mesures	Jusqu'à 7 jours après le début de l'exanthème
Transport du patient	<p>Port d'un masque de soins par le patient Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</p>
Mesures spécifiques	<p>Les personnes non immunes ne devraient pas entrer en contact avec les patients infectés Les femmes enceintes non immunes doivent éviter impérativement le contact avec les patients atteints de rubéole</p>

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques

Masque	Masque de soins lorsque de l'examen physique (soins rapproché) du patient Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Mesures complémentaires	Vaccination du personnel non immun (vaccin ROR) Le personnel non immun ayant eu un contact non protégé avec un patient, doit contacter rapidement le médecin du personnel Les femmes enceintes non immunes doivent éviter impérativement le contact avec les patients atteints de rubéole

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine après confirmation du laboratoire
---------------------------------	---