

Syphilis

Luès

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Treponema pallidum</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct avec des lésions cutanées ou muqueuses au stade I et II lors de rapports sexuels oraux, anaux, ou vaginaux • par transmission transplacentaire • par contact indirect avec du matériel contaminé (possible mais exceptionnel) • par transfusion sanguine si donneur infecté et dans un stade précoce de la maladie
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	10 jours à 3 mois, en moyenne 3 semaines
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que des lésions cutanées et muqueuses sont présentes. Disparition du risque de transmission 24 à 48 heures après le début d'un traitement de pénicilline

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Documentation système d'alerte	Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine Les flambées de cas doivent être déclarées par le médecin dans un délai de 1 jour
--------------------------------	--