

Angine à streptocoque du groupe A



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes > mains > yeux ou bouche) portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Instaurer des Mesures Additionnelles GOUTTELETES si nourrisson ou jeune enfant
Placement du patient	Chambre individuelle si Mesures Additionnelles GOUTTELETES
Durée des mesures	Jusqu'à 24h après le début du traitement

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques, ou si Mesures Additionnelles GOUTTELETES
Gants	Non, sauf si risque de d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non, sauf si Mesures Additionnelles GOUTTELETES