

Aspergillose



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>A. flavus</i> , <i>A. niger</i>
Réservoir	Ubiquitaire dans la nature (sol, végétation en voie de putréfaction)
Mode de transmission	Inhalation de poussières contenant des spores, surtout en relation avec des travaux ou contamination importante de l'environnement (ventilation)
Transmission interhumaine	Non
Période d'incubation	Probablement entre 2 jours et 3 mois
Durée d'infectiosité	Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Prévention chez les patients immunocompromis (agranulocytose > 10 jours): 1) chambre avec ventilation en pression positive et filtre ultrafiltrant 2) les déplacements hors chambre des patients immunocompromis doivent être réduits au minimum et le patient doit porter un masque FFP2 3) lors de travaux dans l'enceinte de l'hôpital, prendre les précautions indiquées par le service HPCI pour éviter la propagation de poussières dans les unités d'hospitalisation

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non