

Conjonctivite virale aiguë ou hémorragique



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérovirus, Adénovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées • Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Entérovirus: 12h à 3 jours Adénovirus: 5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité	Entérovirus: au moins 4 jours après le début des symptômes cliniques Adénovirus: au maximum 14 jours après le début des symptômes cliniques

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Placement du patient	Chambre individuelle
Signalétique	Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat (pas nécessaire si simple passage dans la chambre)
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linges usuels. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none">• - changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre• - désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----