

Contact VRE (Entérocoque résistant à la vancomycine)

Contact ERV ou ERG



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Enterococcus faecium</i> ou <i>faecalis</i> résistant à la vancomycine (VRE ou ERG)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage (très variable: de quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	<p>CONTACT (= quarantaine jusqu'à exclusion du portage de VRE) si la date du contact remonte à moins de 3 mois.</p> <p>Les Précautions Standard sont suffisantes si le dernier contact remonte à plus de 3 mois</p>
Suivi microbiologique	Frottis rectal à J0, 7 et 14
Placement du patient	Chambre individuelle si mesures CONTACT (< 3 mois). Cohortage possible (placer plusieurs patients "contact VRE" dans la même chambre)
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre • Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre • Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre • Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport • Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement • Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Selon directives du service HPCI (jusqu'à exclusion du portage de VRE par 3 frottis rectaux négatifs à J0, 7 et 14 à partir de la dernière exposition)
Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Literie et chemise du patient propres • Désinfection du lit

	<ul style="list-style-type: none"> • Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates • Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Circulation du patient	En principe pas de sortie de la chambre. Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge et en accord avec le service HPCI (rééducation, long séjour, etc.): chemise propre, flacon de poche de solution hydro-alcoolique
Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas s'asseoir sur le lit • Désinfection des mains en sortant de la chambre
Transfert/sortie	Avertir le service/l'établissement de soins de destination

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----