

## Faux-croup



### Epidémiologie

Agent infectieux	Virus Parainfluenza et autres virus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmission par des particules de grosse dimension (&gt; 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc.</li> <li>• ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source</li> <li>• les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur</li> <li>• portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours
Durée d'infectiosité	Pendant toute la durée des symptômes

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	GOUTTELETES
Placement du patient	Chambre individuelle souhaitable. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
Signalétique	<p>Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre</p> <p>Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre</p> <p>Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre</p> <p>Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport</p> <p>Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement</p> <p>Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat</p>
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique
Transport du patient	<p>Port d'un masque de soins par le patient</p> <p>Literie et chemise du patient propres</p> <p>Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</p> <p>Limiter les déplacements aux besoins essentiels</p>
Visiteurs	<p>Ne pas s'asseoir sur le lit</p> <p>Désinfection des mains en sortant de la chambre</p>

**Mesures de protection/prévention pour le personnel**

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Mesures complémentaires	Si procédure générant des aérosols (intubation/extubation, trachéotomie, bronchoscopie, VNI/Optiflow, laryngoscopie, expectoration induite) le port du masque FFP 2 et de lunettes de protection est recommandé

**Nettoyage/désinfection**

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"><li>• - changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre</li><li>• - désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)</li></ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

**Déclaration du cas**

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----