

## Fièvre jaune

### Epidémiologie

Agent infectieux	Arbovirus (Flavivirus)
Réservoir	Zones urbaines: homme, moustiques ( <i>Aedes aegyptii</i> , <i>Aedes spp</i> )  Forêts: primates, marsupiaux, moustiques ( <i>Aedes aegyptii</i> , <i>Aedes spp</i> )
Mode de transmission	Par les moustiques du genre <i>Aedes</i>
Transmission interhumaine	Non si absence du moustique vecteur
Période d'incubation	3 à 6 jours
Durée d'infectiosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• les personnes malades sont infectieuses pour les moustiques pendant les 3 à 5 jours premiers jours</li><li>• les moustiques (vecteurs) deviennent infectieux 9 à 12 jours après le repas de sang et le restent en permanence</li></ul>

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans les 24 heures
---------------------------------	---