

Fièvre thyphoïde et parathyphoïde



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Salmonella Typhi</i> (<i>S. enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhi) ou <i>Salmonella Paratyphi</i> A, B, ou C
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> dans la communauté: par consommation d'aliments ou d'eau contaminée à l'hôpital: par des objets ou du matériel souillés par des selles ou de l'urine
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Typhi: 3 à 60 jours, le plus souvent entre 8 et 14 jours Paratyphi: 1 à 10 jours
Durée d'infectiosité	Tant que l'agent infectieux est présent dans les selles (quelques jours à plusieurs semaines)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT si patient avec incontinence fécale ou non compliant aux mesures d'hygiène de base
Placement du patient	Chambre individuelle si mesures additionnelles de CONTACT
Mesures spécifiques	Le personnel de cuisine doit être exclu du travail pendant la phase aiguë de la maladie et jusqu'à obtention de 3 coprocultures négatives

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine