

# Gale

## Scabies



Contact

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>hominis</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct prolongé entre patients</li> <li>• par relations sexuelles</li> <li>• par contact indirect, lors de manipulation de linge de corps, chemises de nuit, literie immédiatement après utilisation</li> <li>• la gale norvégienne est hautement contagieuse en raison d'une desquamation importante</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 à 6 semaines lors de primo-infection</li> <li>• 1 à 4 jours lors de réinfection</li> </ul>
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 à 48 h après la première dose de traitement. En cas de gale norvégienne, plusieurs traitements peuvent être nécessaires et l'infectiosité peut être prolongée

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GANTS
Placement du patient	Chambre individuelle souhaitable. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
Hygiène des mains	Gants non stériles pour contact avec le patient ou son environnement immédiat. Changement de gants et désinfection des mains entre chaque soin
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre</li> <li>• Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre</li> <li>• Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre</li> <li>• Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport</li> <li>• Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement</li> <li>• Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat</li> </ul>
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 24 heures après le début du traitement si atteinte limitée, selon recommandations du service HPCI si gale norvégienne
Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literie et chemise du patient propres</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désinfection du lit</li> <li>• Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</li> <li>• Limiter les déplacements aux besoins essentiels</li> </ul>
Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas s'asseoir sur le lit</li> <li>• Désinfection des mains en sortant de la chambre</li> </ul>
Mesures spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le patient doit se doucher 8h après la prise d'ivermectine</li> <li>• Une prophylaxie doit être discutée avec le service HPCI pour les personnes (membres du personnel, patients, entourage du patient) ayant eu des contacts directs peau à peau avec les patients. Une poignée de main n'est pas considérée comme une exposition à risque</li> <li>• A la fin du traitement, lavage des vêtements et de la literie à 60°C ou mise en sac plastique fermé hermétiquement pendant 4 jours à l'extérieur ou au réfrigérateur durant 24h (p.ex. jouets en peluche des enfants)</li> <li>• Meubles rembourrés: gale typique - pas de mesures, gale norvégienne (<i>Scabies crustosa</i>) - passer l'aspirateur</li> <li>• La transmission par l'intermédiaire d'objets inanimés (linge, literie) reste très limitée car les parasites meurent rapidement s'il n'y a pas de contact avec l'hôte</li> </ul>

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Gants non stériles pour contact avec le patient ou son environnement immédiat. Changement de gants et désinfection des mains entre chaque soin
Masque	Non
Mesures complémentaires	Prophylaxie postexpositionnelle recommandée dans certains cas, s'adresser au service HPCI et à la médecine du personnel

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> <li>• changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre</li> <li>• désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

**Documents associés**

Documents en lien	<a href="#">Gale- Mesures en milieux de soins</a>
-------------------	---

**Déclaration du cas**

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----