

Poliomyélite



Epidémiologie

Agent infectieux	Poliovirus (appartient au groupe des entérovirus)
Réservoir	Homme (en 2016, les pays d'endémie restants sont l'Afghanistan et le Pakistan)
Mode de transmission	Principalement par voie féco-orale et par contact direct (gouttelettes)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	7 à 14 jours dans les cas avec paralysie, les extrêmes allant de 3 à 35 jours
Durée d'infectiosité	L'excrétion du virus dans les selles commence déjà 36 heures après l'exposition et peut durer 3 à 6 semaines. Il n'y a pas de porteurs chroniques

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Placement du patient	Chambre individuelle
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre • Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre • Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre • Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport • Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement • Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Literie et chemise du patient propres • Désinfection du lit • Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates • Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de visite de personnes non vaccinées • Ne pas s'asseoir sur le lit

	<ul style="list-style-type: none"> • Désinfection des mains en sortant de la chambre
--	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	Le personnel soignant et le personnel de laboratoire doit être vacciné

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration initiale du médecin dans les 24 heures
Mesures en cas d'épidémie	Un cas unique doit être considéré comme une épidémie et des investigations doivent être entreprises par le Service de la santé publique