

Pseudomonas aeruginosa multirésistant



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> multiresistant: souche résistante à au moins un antibiotique dans au moins 3 classes d'antibiotiques habituellement efficaces (aminosides, carbapénèmes, céphalosporines anti- <i>Pseudomonas</i> , fluoroquinolones anti- <i>Pseudomonas</i> , piperacilline/tazobactam, Aztreonam, Fosfomycine, Colistine)
Réservoir	<ul style="list-style-type: none"> environnement (sol, eau), à l'hôpital en particulier les siphons des lavabos et réservoirs d'eau
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par contact direct entre patients par l'intermédiaire du personnel (mains) par l'intermédiaire du matériel de soins ou d'exams, d'instruments, de l'environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée par le <i>Pseudomonas aeruginosa</i> multiresistant

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT GOUTTELETTES si infection respiratoire
Placement du patient	Chambre individuelle
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement Avant intervention chirurgicale, indiquer le portage de <i>Pseudomonas</i> multi-résistant dans Digistat
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique

Durée des mesures	Maintenir les Mesures Additionnelles CONTACT ou GOUTTELETTES pendant la durée de l'infection. Chez les patients avec mucoviscidose ou les greffés pulmonaires colonisés au long cours, maintenir les Mesures Additionnelles pendant toute la durée du séjour. La levée éventuelle de ces mesures doit être discutée au cas par cas avec l'équipe HPCI et les pneumologues.
Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Masque de soins pour le patient si infection des voies respiratoires • Literie et chemise du patient propres • Désinfection du lit • Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates • Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas s'asseoir sur le lit • Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non, sauf si Mesures Additionnelles GOUTTELETTES

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : Filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----