

Rougeole



Epidémiologie

Agent infectieux	Virus de la rougeole (famille des Paramyxovirus, genre Morbillivirus)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par fines gouttelettes < 5 microns (aérosols), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou l'éternuement. Elles peuvent rester en suspension dans l'air quelques heures et être transportées à distance. D'autres personnes peuvent donc s'infecter sans qu'il y ait une proximité immédiate avec le patient source • par contact direct avec des sécrétions nasopharyngées d'une personne infectée • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	<ul style="list-style-type: none"> • médiane : 10 jours (14 jours jusqu'à l'apparition de l'exanthème) • extrêmes : 7 à 21 jours
Durée d'infectiosité	De J-4 avant à J+4 après le début de l'exanthème (=J0)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	AEROSOL
Placement du patient	Chambre individuelle, de préférence avec sas et pression négative Pour l'HEL se référer à Rougeole - prise en charge HEL
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre • Statif avec masques FF2 et affiche mesures vestimentaires devant la chambre • Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre • Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport • Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	Enquête d'entourage selon directives de l'unité HPCI
Durée des mesures	Jusqu'à 4 jours après le début de l'exanthème

Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Port d'un masque de soins pour le patient • Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates • Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Les visiteurs non immuns ne devraient pas entrer en contact avec les patients infectés • Port de masque FFP2 • Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque FFP2, pas nécessaire pour le personnel immunisé contre la rougeole avec documentation par la médecine du personnel
Mesures complémentaires	<p>Le personnel doit être vacciné (vaccin ROR 2 doses)</p> <p>Le personnel non immun doit éviter le contact avec des patients présentant une rougeole</p> <p>Le personnel non immun ayant eu un contact non protégé doit contacter immédiatement la médecine du personnel. La vaccination effectuée dans les 72 heures post contact permet de prévenir l'infection</p>

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, changer le lit et la literie
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien</p> <p>A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pas de changement du rideau • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration initiale du médecin dans les 24 heures