

# Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

## Infection / Colonisation



Contact

### Epidémiologie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Agent infectieux          | <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (MRSA, SARM)  |
| Réservoir                 | Homme, rarement l'animal  |
| Mode de transmission      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct entre patients</li> <li>• par l'intermédiaire du personnel (mains)</li> <li>• par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat du patient)</li> <li>• par contact direct avec un animal colonisé</li> </ul> |
| Transmission interhumaine | Oui   |
| Période d'incubation      | Variable  |
| Durée d'infectiosité      | Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA. Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement   |

### Prise en charge du patient

|                        |  |
|------------------------|--|
| Mesures additionnelles | CONTACT<br><br>+ GOUTTELETTES si infection respiratoire  |
| Suivi microbiologique  | Suivi microbiologique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réadmission d'un patient connu :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dépistage par frottis nez, gorge, plis inguinaux</li> <li>○ Si 1er dépistage négatif fait sans antibiotique, faire un 2ème dépistage &gt; 48h après le 1er</li> </ul> </li> </ul>   |
| Placement du patient   | Chambre individuelle. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)   |
| Signalétique           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche A3 sur la porte à l'extérieur de la chambre</li> <li>• Statif avec blouses et affiche mesures vestimentaires devant la chambre</li> <li>• Affiche sortie sur la porte à l'intérieur de la chambre</li> <li>• Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport</li> <li>• Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement</li> <li>• Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat</li> </ul> |
| Matériel de soins      | Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures   |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique   |
| Décolonisation         | Indications: hémodialyse, avant chirurgie propre ou sur préavis du service HPCI  |
| Voisins                | Enquête d'entourage selon directives du service HPCI - dépistages par frottis nez/gorge/aïne   |
| Durée des mesures      | Pendant toute la durée du portage MRSA (selon indication du service HPCI)  |
| Transport du patient   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toilette effectuée</li> <li>• Literie et chemise du patient propres</li> <li>• Désinfection du lit</li> <li>• Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</li> <li>• Limiter les déplacements aux besoins essentiels</li> </ul>   |
| Circulation du patient | Limiter les sorties de la chambre. Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge (rééducation, long séjour, etc.): toilette effectuée, chemise propre, remettre un flacon de poche de solution hydro-alcoolique au patient. Il n'est pas autorisé à séjourner dans les espaces communs du service, mais peu marcher dans les couloirs, aller se promener à l'extérieur du service. |
| Visiteurs              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas s'asseoir sur le lit</li> <li>• Désinfection des mains en sortant de la chambre</li> </ul>   |
| Mesures spécifiques    | Distribuer la brochure d'information au patient  |
| Transfert/sortie       | Avertir le service/l'établissement de soins de destination   |

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

|                      |  |
|----------------------|--|
| Blouse de protection | Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre |
| Gants                | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques   |
| Masque               | Non, sauf si infection pulmonaire à MRSA (masque de soins)   |

### Nettoyage/désinfection

|                   |  |
|-------------------|--|
| Matériel de soins | Utiliser le détergent/désinfectant usuel   |
| Lit et literie    | Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, changer le lit et la literie  |
| Environnement     | Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien<br>A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> <li>• changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre</li> <li>• désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)</li> </ul> |
| Déchets           | Elimination des déchets selon les filières habituelles   |
| Autres            | Vaisselle: circuit habituel  |

### Déclaration du cas

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Déclaration au service HPCI | oui |
|-----------------------------|-----|