

Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)



Epidémiologie

Agent infectieux	MERS coronavirus
Réservoir	Camélidés (dromadaires, chameaux)
Mode de transmission	Par contact étroit et possiblement par voie respiratoire
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	2 à 14 jours, en moyenne 5 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à guérison

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + AEROSOL
Placement du patient	Chambre individuelle avec sas
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Selon indications de l'infectiologue et du service HPCI
Mesures spécifiques	Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV
Gants	Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV
Masque	Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles, changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien. A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: - changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre - désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit,

	statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui, dans l'heure
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin par téléphone dans les 2 heures