

## Trichinose



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Trichinella spiralis</i> (parasite nématode)
Réservoir	Porcs, chevaux, chiens, chats et nombreux animaux sauvages (rats, renards etc.)
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>dans la communauté: avant tout, par la consommation de viande de porc crue ou insuffisamment cuite, par la charcuterie préparée à partir de ces viandes, plus rarement par consommation de viande de cheval ou de chasse</li> <li>à l'hôpital: pas de transmission connue</li> </ul>
Transmission interhumaine	Non
Période d'incubation	Des signes intestinaux peuvent apparaître après 8 à 15 jours (extrêmes 5 à 45 jours)
Durée d'infectiosité	Pas de transmission interhumaine

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine
---------------------------------	---