

Zika virus


 Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	Virus Zika (Arbovirus du genre Flavivirus)
Réservoir	Homme (en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique)
Mode de transmission	Par la piqûre de moustique <i>Aedes aegypti</i> dans les régions tropicales et subtropicales. Le moustique <i>Aedes albopictus</i> transmet également le virus et est capable d'hiberner pour survivre dans des régions aux températures plus basses.
Transmission interhumaine	<ul style="list-style-type: none"> • par voie sexuelle • verticale pendant la grossesse et lors de l'accouchement • par transfusion sanguine • par transplantation d'organe
Période d'incubation	Quelques jours après la piqûre par un moustique infecté
Durée d'infectiosité	Plusieurs jours à plusieurs semaines

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans les 24 heures
---------------------------------	---