

Contact carbapénèmase



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> producteurs de carbapénèmases
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénèmase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Mise en place de Mesures Additionnelles Contact si le contact remonte à moins de 3 mois Les précautions Standard sont suffisantes si le contact remonte à plus de 3 mois
Suivi microbiologique	Dépistage d'un éventuel portage en accord avec le service HPCI par <ul style="list-style-type: none"> • Frottis rectal (avec <u>matière fécale visible</u>) à J0 et J7 et J14
Placement du patient	En chambre individuelle dans la mesure du possible Cohortage possible
Signalétique	Pour les patients en Mesures Additionnelles contact <ul style="list-style-type: none"> • Affiche sur la porte • Blouse à l'extérieur ou l'intérieur de la chambre
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à exclusion du portage
Transport du patient	Vêtements propres Avertir le service de destination Limiter les déplacements

Circulation du patient	<p>Pour les patients en mesures additionnelles Contact, sortie de chambre autorisées absence de diarrhées ou d'incontinence fécale non contenue) pour physiothérapie, ergothérapie, rééducation, repas en salle commune, en accord avec l'Unité cantonale HPCi, selon les modalités suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • habits propres <p>Maintien en chambre si diarrhées</p>
Visiteurs	<p>Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre</p>
Transfert/sortie	<p>Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</p>

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	<p>Utiliser les sacs à linge usuel A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient</p> <ul style="list-style-type: none"> • désinfection minutieuse du lit et changer la literie
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des mesures additionnelles ou au départ du patient</p> <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau, même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient
Déchets	Élimination selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	oui
-----------------------------	-----