

Gastroentérite virale chez l'adulte non Norovirus ni Sapovirus ni Rotavirus

Epidémiologie

Agent infectieux	Nombreux agents dont: Adenovirus, Enterovirus (Coxsackie, Echovirus), Astrovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: essentiellement par la nourriture, éventuellement par la consommation d'eau contaminée • à l'hôpital: par contact direct ou indirect avec du matériel contaminé
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Quelques heures à quelques jours
Durée d'infectiosité	Tant que l'agent infectieux est présent, en principe quelques jours

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante CONTACT si patient avec incontinence fécale ou non compliant ou si épidémie nosocomiale
Placement du patient	Chambre individuelle si mesures additionnelles CONTACT

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	Le personnel atteint de gastroentérite virale doit être mis en arrêt de travail jusqu'à disparition des symptômes

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Non Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans les 24 heures
Mesures en cas d'épidémie	Les personnes travaillant dans la restauration doivent être mises à l'arrêt de travail pendant la phase aiguë de la maladie