

Infection invasive à pneumocoques



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par l'intermédiaire des gouttelettes ou par des objets contaminés par des sécrétions respiratoires fraîchement émises la transmission de <i>S.pneumoniae</i> conduit le plus souvent à une colonisation mais pas à une infection. De ce fait, on ne propose pas d'isolement
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours
Durée d'infectiosité	Un traitement antibiotique par de la pénicilline permet de supprimer l'infectiosité en l'espace de 24 à 48 heures

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---------------------------------------------------------------

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai d'une semaine des maladies invasives à pneumocoques
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------