

Infection ou colonisation à entérobactéries non-*E. coli* productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (ESBL)



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries autres que <i>E. coli</i> (<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>E. cloacae</i> ...) productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (ESBL ou BLSE)
Réservoir	Homme, animaux
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, dépend de la bactérie incriminée
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée (portage intestinal de quelques mois à plusieurs années)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en présence de facteurs de risque (infection à ESBL, plaie ouverte avec ESBL, incontinence urinaire ou sonde vésicale avec ESBL dans urine, incontinence fécale ou iléostomie avec portage digestif d'ESBL, trachéotomie avec présence d'ESBL dans expectorations)
Suivi microbiologique	Réadmission d'un patient connu <ul style="list-style-type: none"> • à l'admission, si dernier prélèvement remonte à plus de 30 jours, faire un dépistage par frottis rectal et culture d'urine si sonde • si résultat du dépistage est négatif et fait sans antibiotique, faire un 2ème dépistage (ceci à plus de 6 jours d'intervalle) • si résultat du 2ème dépistage est négatif: <u>levée des mesures</u>
Placement du patient	Chambre individuelle (chambre à 2 lits peut être envisagée si le patient n'a pas de diarrhées ou incontinence fécale)
Signalétique	Si Mesures Additionnelles, affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses devant la chambre ou dans la chambre
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Privilégier le matériel à usage unique (UU) • Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement

Durée des mesures	Pendant toute la durée de la présence de facteurs de risque (selon indication du service HPCI)
Transport du patient	Vêtements du patient propres Désinfection du moyen de transport (lit, chaise roulante, cannes, déambulateur) Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	En absence d'infection, de diarrhées, d'incontinence fécale ou de plaie non contenue, le patient peut circuler librement avec <ul style="list-style-type: none"> • vêtements propres (non souillés) • flacon de poche de solution hydro-alcoolique
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Distribuer au patient le dépliant d'information (Patient porteur d'ESBL)
Transfert/sortie	Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, chez patient en <u>Mesures Additionnelles</u> (= présence de facteur de risque), lors des soins en chambre si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre Pas nécessaire lors des soins hors chambre (physiothérapie, ergothérapie)
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> • désinfection minutieuse du lit et changer la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien Lors de la levée des mesures ou au départ du patient : <ul style="list-style-type: none"> • le matériel déposé dans un périmètre > à 2 m sera conservé (boites de gants, masques, etc.) sauf en cas de souillures visibles • le matériel présent dans un périmètre < à 2 m (environnement proche du patient) sera jeté • Tout le matériel désinfectable présent en chambre sera désinfecté • Les rideaux ou parois de séparation sont changés ou désinfectés respectivement
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Autres	Vaisselle : filière habituelle
--------	--------------------------------

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----