

Infections à staphylocoques dorés sensibles

Peau, plaie ou brûlure (écoulement mineur)



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Staphylococcus aureus</i> sensible à la méticilline
Réservoir	Homme, animal
Mode de transmission	Le plus souvent de personne à personne, parfois d'animal à personne, ainsi que manuportée ou par l'intermédiaire d'objets contaminés Infection endogène (autoinfection) chez les personnes colonisées (environ 30% de la population générale est colonisée par des staphylocoques dorés au niveau du nez)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, le plus souvent entre 4 et 10 jours
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que des lésions purulentes sont présentes ou qu'une personne reste colonisée

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Placement du patient	Chambre individuelle si écoulement non contenu dans un pansement
Mesures spécifiques	Des Mesures Additionnelles doivent être instaurées lors d'infection ou de colonisation par des staphylocoques dorés résistants à la méticilline (MRSA), voir sous Staphylocoques résistants à la méticilline ou MRSA

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non