

## Kérato-conjonctivite épidémique



### Epidémiologie

Agent infectieux	Adénovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées</li> <li>• Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 14 jours après le début des symptômes

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Placement du patient	Chambre individuelle
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses devant la chambre Lors d'un transfert avertir le service d'accueil
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Pendant la durée de la maladie, au maximum 14 jours après le début des symptômes cliniques
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	Sortie de chambre autorisée pour physiothérapie, rééducation selon les modalités suivantes et en accord avec le service HPCI <ul style="list-style-type: none"> <li>• vêtements propres, flacon de solution hydro-alcoolique</li> </ul> Eviter les lieux communs (salle à manger, salon)
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
----------------------	--

	Pas nécessaire lors des soins hors chambre (physiothérapie, ergothérapie, etc.)
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> <li>désinfection minutieuse du lit et changer la literie</li> </ul>
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> <li>changement du rideau de séparation, même si le patient reste dans la même chambre</li> <li>désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc)</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Non Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans les 24 heures