

Nouveau coronavirus COVID-19



Epidémiologie

Agent infectieux	Virus SARS-CoV-2
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Par contact étroit et par voie respiratoire
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	En moyenne 3 à 7 jours, extrêmes de 2 à 14 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à guérison

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Mise en place de Mesures Additionnelles Gouttelettes.
Suivi microbiologique	Frottis naso-pharyngé à la recherche de CoVID-19
Placement du patient	En chambre individuelle ou cohortage
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur (MAG)
Matériel de soins	Privilégier du matériel à usage unique. Le matériel de soins pouvant être retraité est réservé au patient jusqu'à l'exclusion du diagnostic ou pendant toute la durée de l'isolement.
Durée des mesures	Maintien des mesures au moins 7 jours* après le début des symptômes et 48h sans symptômes *Pour les patients immunosupprimés : 14 jours
Transport du patient	En ambulance <ul style="list-style-type: none"> • Faire porter un masque de soins (type II ou IIR) au patient • Port d'un masque de soins par le soignant qui accompagne le patient à l'arrière du véhicule • Respect des Précautions Standard par le personnel du véhicule , en particulier respect des 5 indications à l'hygiène des mains Entre 2 transports, procéder au nettoyage du véhicule selon les recommandation habituelles
Circulation du patient	Confinement en chambre Si sortie de chambre, faire porter d'un masque de soins au patient
Visiteurs	Limiter les visites Port d'un masque de soins Désinfection des mains avant l'entrée dans la chambre <u>et à la sortie de la chambre</u>
Mesures spécifiques	Se référer à la recommandation CoVID-19
Transfert/sortie	mettre un masque de soins au patient lors du transfert

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient et son environnement proche
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins à mettre avant d'entrer dans la chambre
Mesures complémentaires	<p>Les prélèvements pour dépistage ne nécessite pas de masque FFP2, le masque de soins suffit.</p> <p>L'utilisation du masque FFP2 auprès de patients suspects ou positifs COVID-19</p> <ul style="list-style-type: none"> • lors de procédures générant des aérosols • pour le personnel non-immun, lors de contact avec un patient suspect ou positif qui ne peut pas porter un masque et si contact >15 mn et <1,5 m.

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le désinfectant usuel
Lit et literie	Changement de la literie au départ du patient ou à la levée des mesures Désinfection minutieuse du lit et de l'environnement
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien. au transfert du patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.).
Déchets	Utiliser la filière habituelle

Documents associés

Documents en lien	Recommandation CoVID-19 Prise en charge
-------------------	---

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	oui
Déclaration au médecin cantonal	<p>Les médecins déclarent au service du médecin cantonal (infectionsdeclarations@hin.ch) et à l'OFSP (formulaire) dans les 24h :</p> <p>- les résultats cliniques de personnes hospitalisées avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CoVID-19 confirmé en laboratoire par PCR • ou critères cliniques et une imagerie par CT-Scan compatible avec CoVID-19 et PCR négative sans autre étiologie • ou critères cliniques et épidémiologiques et PCR négative sans autre étiologie <p>- les résultats cliniques des personnes décédées (formulaire décès OFSP)</p>

avec:

- CoVID-19 confirmé en laboratoire par PCR
- ou critères cliniques et imagerie par CT-scan compatible avec CoVID-19
- critères cliniques et épidémiologiques