

Trichinose



Précautions
Standard

Epidémiologie

| | |
|---------------------------|---|
| Agent infectieux | <i>Trichinella spiralis</i> (parasite nématode) |
| Réservoir | Porcs, chevaux, chiens, chats et nombreux animaux sauvages (rats, renards etc.) |
| Mode de transmission | <ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: avant tout, par la consommation de viande de porc crue ou insuffisamment cuite, par la charcuterie préparée à partir de ces viandes, plus rarement par consommation de viande de cheval ou de chasse • à l'hôpital: pas de transmission connue |
| Transmission interhumaine | Non |
| Période d'incubation | Des signes intestinaux peuvent apparaître après 8 à 15 jours (extrêmes 5 à 45 jours) |
| Durée d'infectiosité | Pas de transmission interhumaine |

Prise en charge du patient

| | |
|------------------------|---|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante |
|------------------------|---|

Mesures de protection/prévention pour le personnel

| | |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Masque | Non |

Déclaration du cas

| | |
|---------------------------------|---|
| Déclaration au médecin cantonal | Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine |
|---------------------------------|---|