

## Tuberculose pulmonaire ou laryngée MDR ou XDR

### Cas suspect ou confirmé



#### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par fines gouttelettes &lt; 5 microns (aérosols) de sécrétions bronchiques qui sont dispersées dans l'air principalement lors de quintes de toux et inhalées par les personnes partageant les mêmes locaux pendant plusieurs heures. Seules les personnes atteintes de tuberculose des voies aériennes (poumons, bronches, larynx) peuvent transmettre la maladie</li> <li>• risque d'aérosolisation en laboratoire et lors de chirurgie ou d'autopsies</li> <li>• la transmission directe à partir de lésions cutanées ou de fistules en cas de tuberculose pleurale ou osseuse est en principe possible, mais en réalité exceptionnelle</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Primo-infection : 2 à 10 semaines. Tuberculose active: mois à années
Durée d'infectiosité	Théoriquement aussi longtemps qu'il y a des bacilles viables dans les expectorations

#### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	AEROSOL
Placement du patient	Transfert au CHUV dans les plus brefs délais Chambre individuelle avec sas et pression négative exigée
Signalétique	Dans l'attente du transfert au CHUV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre demandant le port de masque ultrafiltrant FFP2 pour toute personne avant d'entrer dans la chambre</li> <li>• masques FFP2 devant la chambre</li> </ul>
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient jusqu'au transfert Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	Enquête d'entourage selon directives du service HPCI et de la ligue pulmonaire vaudoise (LPV). Le cas échéant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• transmettre la liste des patients exposés avant la mise en place des MAA au responsable HPCI, qui prendra contact avec la LPV pour la mise en place des mesures qui s'imposent.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>transmettre la liste du personnel exposé avant la mise en place des MAA à la médecine du personnel (MDP) pour prise en charge</li> </ul> <p><u>Remarque</u> Une exposition est considérée comme significative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>patient exposé &gt; 8h sauf si patient immunocompromis (enquête pour tous les patients immunocompromis quel que soit le temps d'exposition): <u>enquête coordonnée par le médecin</u> en collaboration avec la LPV</li> <li>personnel exposé &gt; 8h pour laquelle une enquête sera faite d'emblée: <u>enquête coordonnée par le médecin du personnel</u></li> <li>personnel exposé &gt; 45 min si contact très rapproché (bronchoscopie, endoscopie, réanimation, équipe chirurgical au bloc op)</li> </ul>
Durée des mesures	Jusqu'au transfert au CHUV
Transport du patient	Port d'un masque chirurgical II ou IIR pour le patient Avertir le service de transport et de destination pour qu'ils prennent les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Circulation du patient	Maintien en chambre jusqu'au transfert
Visiteurs	Port de masque FFP2 Désinfection des mains en sortant de la chambre Limiter les visites à l'entourage proche, maximum 2 visites en même temps
Mesures spécifiques	Dans l'attente du transfert: informer le patient qu'il doit tousser dans un mouchoir pour réduire la formation d'aérosols
Transfert/sortie	Port d'un masque FFP2 sans valve pour le patient Port d'un masque FFP2 pour l'accompagnant dans l'ambulance (cellule sanitaire)

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque FFP2
Mesures complémentaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>le personnel qui a été en contact avec un patient bacillaire avant la mise en place d'un isolement respiratoire sera annoncé à la médecine du personnel pour surveillance</li> <li>le personnel qui présente une immunodéficience ne doit pas s'occuper de patients bacillaires</li> </ul>

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linges usuels
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien Au transfert du patient

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ouvrir la fenêtre et garder la porte fermée</li> <li>• attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimination des déchets selon les filières habituelles</li> </ul>

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration initiale du médecin dans les 24 heures