

## Angine à streptocoque du groupe A



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>par des particules de grosse dimension (&gt; 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source</li> <li>les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes &gt; mains &gt; yeux ou bouche)</li> <li>portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Matériel de soins	Réservé au résident pendant la durée de la maladie Privilégier le matériel à usage unique
Circulation du patient	Limitier les déplacements durant les 24 heures après début du traitement antibiotique

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang et des liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct. Utiliser le détergent usuel pour les sols.
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles