

Contact VRE (Entérocoque résistant à la vancomycine)

Contact ERG (entérocoque résistant aux glycopeptides)



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Enterococcus faecium</i> ou <i>faecalis</i> résistant à la vancomycine (VRE ou ERG)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage (très variable: de quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	Admission d'un patient ayant eu un contact avec un patient porteur de VRE, en accord avec l'unité cantonale HPCI <ul style="list-style-type: none"> • <u>contrôle de la colonisation (portage) par un frottis rectal (avec matière fécale visible) à J0 et J7 et J14</u>
Placement du patient	En cas de diarrhées, sanitaires dédiés et maintien en chambre jusqu'à réception du dépistage
Durée des mesures	Selon directives du service HPCI

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct et des sanitaires Utiliser le détergent usuel pour les sols
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----